

Potíže s močovým měchýřem

Rakovina močového měchýře je šestým nejčastějším zhoubným onemocněním v ČR.

Potíže s močovým měchýřem

○ Jaké jsou příčiny rakoviny močového měchýře a jaké jsou nejčastější příznaky? Je rakovina močového měchýře bolestivá? Petr C., Olomouc

Rakovina močového měchýře je šestým nejčastějším zhoubným onemocněním v ČR. Její výskyt se stále zvyšuje, nejčastěji se vyskytuje ve věkové kategorii nad 60 let a více u mužů.

Příčina není jednoznačná, ale jsou jasně prokázány významné rizikové faktory, které se na jejím vzniku podílejí. Nejvýznamnějším rizikem je kouření cigaret, následuje profesní vystavení karcinogenním látkám v průmyslových provozech, jako je gumárenství, zpracování hliníku, železa, tiskařství, ale i práce s kadeřnicími barvami. Nejčastějším příznakem je bezbolestná a viditelná přítomnost krve v moči, dále příznaky dráždění močových cest, tedy nucení na močení a řezání při močení. Bolestivé bývají většinou až pokročilé nálezy, které mohou být spojeny se zablokováním močových cest a bolestmi nejen v podbřišku, ale i v oblasti ledvin.



Odpovídá MUDr. Mgr. Magda Krechlerová, FEBU, Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně

Rakovina močového měchýře je šestým nejčastějším zhoubným onemocněním v ČR.

Text byl publikován v rubrice Radí odborníci v časopise Zdraví 15. 12. 2014.