

# Výsledky léčby pacientů s pozitivními okraji po radikální prostatektomii

L. Jarolím, Š. Veselý, K. Dušková, J. Do Carmo, V. Novák, M. Babjuk

Urologická klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha

## CÍL

Zhodnocení indikace radioterapie po radikální prostatektomii indikované pro nález pozitivních okrajů preparátu.


## MATERIÁL A METODY

V souboru 910 pacientů po retropubické radikální prostatektomii prokázala definitivní histologie v 72 případech pozitivní okraje (7,9 %). V retrospektivní studii byly srovnány výsledky následné radioterapie proti samotnému sledování.

## VÝSLEDKY

Celkem 16 pacientů bylo předáno do péče svým urologům, byla jim doporučena androgenní blokáda (ADT), adjuvantní (ART) nebo salvage radioterapie (SRT).

	n	GS (medián)	PSA před další léčbou (medián, ng/ml)	doba sledování (medián, roky)	poslední PSA (medián, ng/ml)	BR (n/%)
nesledování	3	7				
doporučena ADT	2	8,5				
doporučena ART	3	7				
doporučena SRT	8	7				
ADT	3	7	0,274	5	0,009	
ART	12	7	0,243	5,5	0,010	1 (8)
SRT	18	7	0,104	6	0,011	1 (5,5)
bez léčby	23	7		5	0,030	1 (4,3)
celkem	72					



## SOUHRN

Aplikace adjuvantní radioterapie u všech pacientů po radikální prostatektomii s pozitivními okraji by byla u 31,9 % pacientů sledovaného souboru nadbytečná.