



FAKULTNÍ NEMOCNICE  
OLOMOUC

# Neoadjuvantní chemoterapie u pacientů s invazivními nádory močového měchýře

Žemla P.<sup>1</sup>


<sup>1</sup>Fakultní nemocnice Olomouc, Urologická klinika, Olomouc, ČR

## Úvod

V České republice jsou nádory močového měchýře šestou nejčastější malignitou u mužů a třináctou u žen. Na základě invaze nádoru do svaloviny, CIS nebo rekurentních agresivních nádorů jsou pacienti indikováni k radikální cystektomii. Cílem této práce bylo zhodnotit účinek neoadjuvantní chemoterapie u pacientů, kteří podstoupili radikální cystektomii.

## Metody

Retrospektivně jsme analyzovali vybranou skupinu 48 pacientů, kteří podstoupili radikální cystektomii od roku 2012 do roku 2014. 12 z nich podstoupilo neoadjuvantní chemoterapii, dalších 36 pacientů bez neoadjuvantní chemoterapie bylo zařazeno do kontrolní skupiny. Průměrné pooperační sledování bylo 39 měsíců.



## Zhodnocení

Ačkoliv naše data naznačují příznivý efekt pooperačních výsledků u pacientů, kterým byla aplikována neoadjuvantní terapie, obě skupiny nelze objektivně porovnávat, vzhledem k velké selekční bias pacientů podstupujících neoadjuvantní chemoterapii.