

# LÉČBA EREKILNÍ DYSFUNKCE POMOCÍ APLIKACE ALPROSTADILU VE FORMĚ KRÉMU - PRVNÍ ZKUŠENOSTI.

MUDR. MAREK BROUL<sup>1,2</sup>, PH.D., FECSM; MUDR. JAN SCHRAML<sup>1</sup>, PH.D.; MUDR. PETR SKÁLA<sup>1</sup>

1. KLINIKA UROLOGIE A ROBOTICKÉ CHIRURGIE, MASARYKOVA NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD LABEM

2. SEXUOLOGICKÉ ODDĚLENÍ, MASARYKOVA NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD LABEM

Prezentujeme vlastní soubor pacientů léčených pro erektilní dysfunkci (ED) pomocí alprostadilu ve formě krému. Topická forma krému s alprostadilem je v České republice registrována od listopadu roku 2015 pod názvem Vitaros® krém 3 mg / g. Dostupný na našem trhu je od září 2016.

## Soubor:

Hodnocené období: 10 / 2016 – 7 / 2017


Celkem pacientů: 28 mužů

Průměrný věk pacientů: 63,2 let.


Z toho:

18 po RARP (roboticky asistovaná radikální prostatektomie)

10 jiné příčiny ED



RARP	18
DM	5
Úraz pánve	3
Jiná operace malé pánve	2



## Hodnocení:

Dotazník IIEF 5

Hodnocení spokojenosti

Dotazník EDITS, otázka č. 1

0: zcela nespokojen

4: zcela spokojen

Hodnocení NÚ (nežádoucí účinky)

**Tab. 1 - Dotazník IIEF-5**

Dotazník sexuálního zdraví muže  
Zhodnoťte období uplynulých 6 měsíců a u každé otázky zvolte jednu odpověď.

	velmi nízká	nízká	střední	vyšší	nejvyšší
Jaká je Vaše důvěra v možnost dosažení a udržení erekce?	1	2	3	4	5
Pokud u Vás došlo k erekci, jak často byla dostatečná k pohlavnímu styku?	téměř nikdy	jen ojedíněle	občas	většinou	téměř vždy
Pokud došlo k erekci, jak jste byl schopen udržet erekci i po zavedení penisu do pochvy?	téměř nikdy	jen ojedíněle	občas	většinou	téměř vždy
Pokud došlo k pohlavnímu styku, jak obtížné bylo udržet erekci až do Vašeho vyvrcholení - ejakulace?	mimořádně obtížné	velmi obtížné	obtížné	nepříliš obtížné	snadné
Pokud došlo k pohlavnímu styku, jak často byl pro Vás uspokojivý?	téměř nikdy	jen ojedíněle	občas	většinou	téměř vždy

Zdroj: ROSEN, RC, et al. Development and evaluation of an abridged, 5-item version of the international index of erectile function (IIEF-5) as a diagnostic tool for erectile dysfunction. Int J of Impotence Res. 1999, 11, p. 319-326.

## Hodnocení nežádoucích účinků

Pouze 2 pacienti (každý z jedné skupiny RARP x jiné) cítili pálení v uretře.

Výskyt NÚ: 7,1 %

Nevedl k ukončení léčby.

IIEF 5	Před th.	Po 3 měsících
RARP	12,5	19,8
Jiné	11,4	18,5

## Spokojenost s léčbou:

Hodnoceno pomocí dotazník EDITS škála 0 – 4.

0: zcela nespokojen

4: zcela spokojen

Průměrná spokojenost s léčbou pacientů po RARP: 3,25 bodů

Průměrná spokojenost s léčbou pacientů skupiny „jiná“: 3,00 bodů

## Závěr:

Alprostadil ve formě krému je vhodný:

- u všech pacientů s ED, kteří hledají rychlou, technicky nenáročnou a dlouhodobě účinnou léčbu
- Nonrespondéři iPDE5
- RARP
- DM, úrazy pánve

