

Výsledky liečby nádorov močového mechúra radikálnou cystektómiou u 130 pacientov – 10 ročné skúsenosti



Ľupták, J., Šulgan, J., Eliáš, B., Kliment, J. sen., Švihra, J. sen., Kliment, J. jr., Sopilko, I., Tomaškin, R., Slávik, P.¹
Urologická klinika JLF UK a UNM Martin, ¹Ústav patologickej anatómie JLF UK a UNM, Martin

Cieľ práce

Radikálna cystektómia (RC) a panvová lymfadenektómia (LND) je štandardnou liečbou pre lokalizované svalovinu infiltrujúce nádory močového mechúra, neinfiltratívne nádory po zlyhaní intravezikálnej liečby ako aj u pacientov s extenzívnymi papilárnymi nádormi neriešiteľnými endoskopicky.

Materiál a metodika

- ❖ Retrospektívna analýza 128 pacientov (115 mužov a 13 žien) po RC a derivácii moču, vek 37-90 rokov (medián 69 rokov), operovaní na Urologickej klinike JLF UK a UNM v Martine v období 01/2008-12/2018.
- ❖ RC a LND urobené štandardným spôsobom u všetkých mužov aj žien.
- ❖ Rozšírená LND len v pokročilom štádiu ochorenia, alebo pri podozrení na mts do ilických LU.
- ❖ 24 pacientov (18,7 %) bolo liečených neoadjuvantnou chemoterapiou (2 pacienti aj RaTH), 56 pacientov (43,7 %) s pokročilým ochorením bolo liečených adjuvantnou chemoterapiou.

Výsledky

Tabuľka 1. Patologické štádium (N=128)

Pat. št.	T0	T CIS	T1	T2a	T2b	T3a	T3b	T4a
Abs/%	5 / 3,9	2 / 1,6	11 / 8,6	14/10,9	21/16,5	28/21,8	26/20,2	21/16,5

Tabuľka 2. Histologický typ

Histol. typ	Abs / %
Urotelový	114 / 89,1
Malobunkový	6 / 4,7
Sarkomatoidný	5 / 3,9
Glandulárna dif.	2 / 1,6
Neuroendokrinná dif.	1 / 0,8

Tabuľka 3. Spôsob derivácie moču

Derivácia moču	Abs/%
Bricker	106 / 82,7
Ureterokutáneostómia	13 / 10,2
Studer	8 / 6,3
Nefrostómia	1 / 0,8

Tabuľka 4. Komplikácie

Clavien - Dindo	Abs / %
II	43 / 34,4
III	4 / 3,2
IV	9 / 7,2
V	4 / 3,2

- ❖ 72 pacientov (56,3 %) nemalo žiadne závažnejšie komplikácie v pooperačnom období.
- ❖ Zo 62 pacientov operovaných v r. 2008-2013 5 rokov prežíva 22 (35,4 %).

Záver

- ❖ RC s panvovou LND je v súčasnosti najúčinnnejšia liečebná metóda u pacientov s infiltratívnymi nádormi močového mechúra s možnosťou kompletného vyliečenia.
- ❖ Operácia je rozsiahly chirurgický zákrok značne zaťažujúci pacienta s potenciálnymi perioperačnými ako aj pooperačnými komplikáciami.
- ❖ Dôsledné predoperačné vyšetrenie so správnou indikáciou a informácia samotného pacienta o výkone nesmie byť podceňovaná.